

ASSIST en Español

Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test — OMS

Instrucciones de aplicación

Autoreporte. Repita ítems 3–8 por cada sustancia consumida en la vida. Escala de riesgo por sustancia. Tiempo: 5–10 min.

0 = Nunca · 2 = Mensual · 3 = Semanal · 4 = Diario o casi diario (ítems 3–8)

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3	4
1	¿Alguna vez ha consumido alguna sustancia psicoactiva (tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, etc.)?	■	■	■	■	■
2	¿Ha consumido alguna sustancia psicoactiva en los últimos 3 meses?	■	■	■	■	■
3	¿Con qué frecuencia ha consumido [sustancia] en los últimos 3 meses?	■	■	■	■	■
4	¿Con qué frecuencia siente un fuerte deseo o urgencia de consumir [sustancia]?	■	■	■	■	■
5	¿Con qué frecuencia su consumo de [sustancia] le ha causado problemas de salud, sociales, legales o financieros?	■	■	■	■	■
6	¿Con qué frecuencia ha dejado de hacer cosas que normalmente esperaba de usted por consumir [sustancia]?	■	■	■	■	■
7	¿Algún amigo, familiar o profesional ha expresado preocupación por su consumo?	■	■	■	■	■
8	¿Ha intentado alguna vez reducir o dejar de consumir [sustancia] sin lograrlo?	■	■	■	■	■

Riesgo por sustancia: Bajo / Moderado / Alto (consultar clave ASSIST)

Interpretación del puntaje

Riesgo	Puntaje	Acción sugerida
Bajo	0 – 3	Psicoeducación breve
Moderado	4 – 26	Intervención breve (BI)
Alto	≥ 27	Derivación a tratamiento especializado

Evalúa consumo de sustancias con ASSIST en Kalyo — kalyo.io

WHO ASSIST Working Group. The ASSIST. Addiction. 2002;97(9):1183-1194.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.