

AUDIT en Español

Alcohol Use Disorders Identification Test — OMS

Instrucciones de aplicación

Autoreporte sobre los **últimos 12 meses**. 10 ítems, escala 0–4 (ítems 9–10: 0/2/4). Tiempo: 2–5 min. Tamizaje de consumo de riesgo y dependencia.

0 = Nunca · 1 = Mensual o menos · 2 = 2–4 veces/mes · 3 = 2–3/semana · 4 = 4+/semana

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3	4
1	¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?	■	■	■	■	■
2	¿Cuántas bebidas alcohólicas consume un día típico cuando bebe?	■	■	■	■	■
3	¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas en una sola ocasión?	■	■	■	■	■
4	¿Con qué frecuencia no pudo dejar de beber una vez había empezado?	■	■	■	■	■
5	¿Con qué frecuencia no pudo hacer lo que se esperaba de usted por haber bebido?	■	■	■	■	■
6	¿Con qué frecuencia necesitó beber en la mañana para recuperarse?	■	■	■	■	■
7	¿Con qué frecuencia se sintió culpable o con remordimientos por haber bebido?	■	■	■	■	■
8	¿Con qué frecuencia no pudo recordar lo ocurrido la noche anterior por haber bebido?	■	■	■	■	■
9	¿Ha resultado herido(a) usted o alguien más por haber bebido?	■	■	■	■	■
10	¿Algún familiar, amigo, médico o profesional ha mostrado preocupación por su consumo?	■	■	■	■	■

PUNTAJE TOTAL: _____ / 40

Interpretación del puntaje

Puntaje	Riesgo	Acción sugerida
0 – 7	Bajo riesgo	Psicoeducación sobre consumo
8 – 15	Consumo de riesgo	Intervención breve; consejo médico
16 – 19	Consumo perjudicial	Tratamiento breve o derivación
20 – 40	Probable dependencia	Evaluación especializada en adicciones

Tamiza consumo de alcohol con AUDIT en Kalyo — kalyo.io