

C-SSRS — Tamizaje en Español

Columbia Suicide Severity Rating Scale — Versión de screening

Instrucciones de aplicación

Heteroaplicada o autoreporte guiado. Preguntas en orden jerárquico; detenerse según protocolo institucional si hay ideación activa. Evaluar riesgo inmediato y plan de seguridad.

Marque Sí/No según respuesta del paciente. Aplicar protocolo de seguridad según nivel.

#	Ítem / Pregunta	No	Sí
1	¿Ha deseado estar muerto(a) o poder dormir y no despertar?	■	■
2	¿Ha tenido pensamientos de hacerse daño o quitarse la vida?	■	■
3	¿Ha pensado en cómo podría hacerse daño o quitarse la vida?	■	■
4	¿Ha tenido intención de actuar según estos pensamientos?	■	■
5	¿Ha empezado a preparar o ha preparado algo para hacerse daño o quitarse la vida?	■	■
6	¿Ha hecho algún intento de suicidio en su vida?	■	■
7	¿Ha hecho algún intento de suicidio en los últimos 3 meses?	■	■
8	¿Ha hecho algo para hacerse daño aunque no quisiera morir?	■	■

Clasificación de riesgo: _____ · Intervención: _____

Interpretación del puntaje

Nivel	Criterio	Acción sugerida
Bajo	Sin ideación o deseo pasivo	Monitoreo rutinario
Moderado	Ideación sin intención/plan	Plan de seguridad; seguimiento cercano
Alto	Intención, plan o preparación	Intervención urgente; no dejar solo(a)
Muy alto	Intento reciente o conducta	Hospitalización / crisis inmediata

Registra evaluaciones de riesgo suicida con protocolo C-SSRS en Kalyo — kalyo.io

Posner K et al. The C-SSRS. Am J Psychiatry. 2011;168(12):1266-1277. Uso clínico con formación.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.