

DUDIT en Español

Drug Use Disorders Identification Test — Tamizaje de drogas

Instrucciones de aplicación

Autoreporte sobre los **últimos 12 meses** (excepto alcohol). **11 ítems**, escala 0–4. Tiempo: 5 min.

0 = Nunca · 1 = Mensual o menos · 2 = 2–4/mes · 3 = 2–3/semana · 4 = 4+/semana

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3	4
1	¿Con qué frecuencia consume drogas distintas del alcohol?	■	■	■	■	■
2	¿Consume más de una droga a la vez?	■	■	■	■	■
3	¿Puede dejar de consumir drogas cuando quiere?	■	■	■	■	■
4	¿Ha tenido «blackouts» o flashbacks por consumo?	■	■	■	■	■
5	¿Se siente mal o culpable por su consumo de drogas?	■	■	■	■	■
6	¿Su pareja (o padres) se quejan de su consumo?	■	■	■	■	■
7	¿Ha descuidado a su familia por consumir drogas?	■	■	■	■	■
8	¿Ha tenido problemas legales por consumo de drogas?	■	■	■	■	■
9	¿Ha perdido amigos por consumir drogas?	■	■	■	■	■
10	¿Ha descuidado sus responsabilidades por consumir drogas?	■	■	■	■	■
11	¿Ha consumido drogas en situaciones peligrosas?	■	■	■	■	■

PUNTAJE TOTAL: ____ / 44 · **Corte:** ≥ 6 (H) / ≥ 2 (M)

Interpretación del puntaje

Puntaje	Riesgo	Acción sugerida
0 – 1	Bajo	Psicoeducación
2 – 5	Moderado (M) / bajo (H)	Intervención breve
6 – 24	Consumo de riesgo (H)	Evaluación clínica de adicciones
≥ 25	Probable dependencia	Derivación a tratamiento especializado

Tamiza consumo de drogas con DUDIT en Kalyo — kalyo.io

Berman AH et al. Evaluation of the DUDIT. Alcohol Alcohol. 2005;40(6):540-545.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.