

HADS en Español

Hospital Anxiety and Depression Scale — Ansiedad y depresión

Instrucciones de aplicación

Autoreporte sobre la **última semana**. 14 ítems (7 ansiedad + 7 depresión), escala 0–3. Tiempo: 2–5 min. Ítems invertidos se recodifican. Puntúe subescalas por separado.

0 = Casi siempre · 1 = A menudo · 2 = A veces · 3 = Casi nunca (ítems invertidos al revés)

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3
1	Me siento tenso(a) o alterado(a)	■	■	■	■
2	Disfruto de las mismas cosas que solía (invertido)	■	■	■	■
3	Tengo una sensación de miedo, como si algo horrible fuera a ocurrir	■	■	■	■
4	Puedo reírme y ver el lado bueno de las cosas (invertido)	■	■	■	■
5	Tengo muchas preocupaciones en la cabeza	■	■	■	■
6	Me siento alegre (invertido)	■	■	■	■
7	Puedo estar sentado(a) tranquilamente y sentirme relajado(a) (invertido)	■	■	■	■
8	Me siento lento(a) y como atontado(a)	■	■	■	■
9	Tengo sensaciones extrañas en el estómago	■	■	■	■
10	He perdido interés en mi apariencia personal	■	■	■	■
11	Me siento inquieto(a), como si tuviera que estar en movimiento	■	■	■	■
12	Espero las cosas con ilusión (invertido)	■	■	■	■
13	Tengo accesos de pánico	■	■	■	■
14	Puedo disfrutar de un buen libro o un programa de radio o TV (invertido)	■	■	■	■

PUNTAJES: HADS-A (ansiedad) ____ / 21 · HADS-D (depresión) ____ / 21

Interpretación del puntaje

Puntaje	Nivel	Acción sugerida
0 – 7	Normal	Sin intervención específica
8 – 10	Leve	Monitoreo y psicoeducación
11 – 14	Moderado	Evaluación clínica; considerar tratamiento
15 – 21	Severo	Intervención activa; valorar derivación

Aplica HADS y registra subescalas en expediente con Kalyo — kalyo.io

Zigmond AS, Snaith RP. The HADS. Acta Psychiatr Scand. 1983;67(6):361-370. Validación en español.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.