

PANSS en Español

Positive and Negative Syndrome Scale — Esquizofrenia

Instrucciones de aplicación

Heteroaplicada por clínico entrenado. 30 ítems: 7 positivos + 7 negativos + 16 generales. Escala 1–7. Tiempo: 30–45 min. Basada en entrevista clínica estructurada.

1 = Ausente · 2 = Mínimo · 3 = Leve · 4 = Moderado · 5 = Moderado-severo · 6 = Severo · 7 = Extremo

#	Ítem / Pregunta	1	2	3	4	5	6	7
1	[Positiva] Delirios	■	■	■	■	■	■	■
2	[Positiva] Desorganización conceptual	■	■	■	■	■	■	■
3	[Positiva] Alucinaciones	■	■	■	■	■	■	■
4	[Positiva] Excitación	■	■	■	■	■	■	■
5	[Positiva] Grandiosidad	■	■	■	■	■	■	■
6	[Positiva] Susplicia/persecución	■	■	■	■	■	■	■
7	[Positiva] Hostilidad	■	■	■	■	■	■	■
8	[Negativa] Afecto embotado	■	■	■	■	■	■	■
9	[Negativa] Retraimiento emocional	■	■	■	■	■	■	■
10	[Negativa] Empobrecimiento del lenguaje	■	■	■	■	■	■	■
11	[Negativa] Empobrecimiento del contenido del pensamiento	■	■	■	■	■	■	■
12	[Negativa] Falta de espontaneidad en la conversación	■	■	■	■	■	■	■
13	[Negativa] Anhedonia social	■	■	■	■	■	■	■
14	[Negativa] Estereotipias motoras	■	■	■	■	■	■	■
15	[General] Ansiedad somática	■	■	■	■	■	■	■
16	[General] Ansiedad psíquica	■	■	■	■	■	■	■
17	[General] Sentimientos de culpa	■	■	■	■	■	■	■
18	[General] Tensión	■	■	■	■	■	■	■
19	[General] Manierismos y pos tura	■	■	■	■	■	■	■
20	[General] Depresión	■	■	■	■	■	■	■
21	[General] Retardo motor	■	■	■	■	■	■	■
22	[General] Falta de cooperación	■	■	■	■	■	■	■
23	[General] Contenido de pensamiento inusual	■	■	■	■	■	■	■

#	Ítem / Pregunta	1	2	3	4	5	6	7
24	[General] Desorientación	■	■	■	■	■	■	■
25	[General] Atención deficiente	■	■	■	■	■	■	■
26	[General] Falta de juicio e insight	■	■	■	■	■	■	■
27	[General] Evitación de contacto social	■	■	■	■	■	■	■
28	[General] Disturbios volitivos	■	■	■	■	■	■	■
29	[General] Impulsividad	■	■	■	■	■	■	■
30	[General] Preocupación somática	■	■	■	■	■	■	■

Positiva: ____ / 49 · **Negativa:** ____ / 49 · **General:** ____ / 112 · **TOTAL:** ____ / 210

Interpretación del puntaje

Subescala	Rango	Acción sugerida
Positiva elevada	≥ 20	Ajuste antipsicótico; manejo de síntomas positivos
Negativa elevada	≥ 20	Rehabilitación psicosocial; psicoterapia
General elevada	≥ 40	Evaluación integral; manejo de comorbilidad
Total ≥ 75	Psicosis activa	Intervención farmacológica y seguimiento intensivo

Documenta PANSS y evolución en psicosis con Kalyo — kalyo.io

Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The PANSS. Schizophr Bull. 1987;13(2):261-276.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.