

PHQ-2 en Español

Patient Health Questionnaire-2 — Tamizaje breve de depresión

Instrucciones de aplicación

Autoreporte. Indique con qué frecuencia le han molestado los problemas durante las **últimas 2 semanas**. Tiempo estimado: menos de 1 minuto. Puede administrarse en papel, digital o de forma verbal en atención primaria.

Escala de respuesta: Para nada (0) · Varios días (1) · Más de la mitad (2) · Casi todos los días (3)

#	Ítem / Pregunta	0	1	2	3
1	Durante las últimas 2 semanas, ¿ha sentido poco interés o placer en hacer las cosas?	■	■	■	■
2	Durante las últimas 2 semanas, ¿se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas?	■	■	■	■

PUNTAJE TOTAL: ____ / 6

Interpretación del puntaje

Puntaje	Resultado	Acción sugerida
0 – 2	Negativo	Sin intervención específica; monitoreo rutinario
≥ 3	Positivo (tamizaje)	Administrar PHQ-9 completo o entrevista clínica

Aplica el PHQ-2 y registra resultados en el expediente con Kalyo — kalyo.io

Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-2. Med Care. 2003;41(11):1284-1292. Instrumento de dominio público.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.