

PSC-17 en Español

Pediatric Symptom Checklist — 17 ítems

Instrucciones de aplicación

Informe de padres para niños 4–16 años. **17 ítems**, escala 0–2. 3 subescalas: Atención, Internalización, Externalización. Tiempo: 5 min.

0 = Nunca · 1 = A veces · 2 = A menudo

#	Ítem / Pregunta	0	1	2
1	Se queja de dolores (aunque no haya enfermedad que los explique)	■	■	■
2	Pasa mucho tiempo solo(a)	■	■	■
3	Se cansa fácilmente, tiene poca energía	■	■	■
4	Es un(a) niño(a) activo(a) que no puede quedarse quieto(a)	■	■	■
5	Se siente triste o deprimido(a)	■	■	■
6	Se distrae fácilmente, le cuesta concentrarse	■	■	■
7	Se siente culpable, se culpa a sí mismo(a)	■	■	■
8	Tiene menos interés en la escuela que antes	■	■	■
9	Parece preocupado(a), parece tener miedo	■	■	■
10	Se queja de no tener amigos	■	■	■
11	Pelea con otros niños	■	■	■
12	Se queja de que otros lo(a) molestan	■	■	■
13	Se queja de que otros lo(a) excluyen	■	■	■
14	Se queja de que otros lo(a) rechazan	■	■	■
15	Se queja de que otros lo(a) ignoran	■	■	■
16	Se queja de que otros lo(a) critican	■	■	■
17	Se queja de que otros lo(a) ridiculizan	■	■	■

TOTAL: ____ / 34 · Corte sugerido: ≥ 15 · AT ____ · INT ____ · EXT ____

Interpretación del puntaje

Puntaje	Resultado	Acción sugerida
0 – 14	Negativo	Monitoreo rutinario
15 – 20	Positivo	Evaluación de salud mental pediátrica
≥ 21	Positivo alto	Derivación a psicología/psiquiatría infantil

Tamiza salud mental pediátrica con PSC-17 en Kalyo — kalyo.io

Gardner W et al. The PSC-17. Ambulatory Child Health. 2001;7(3):225-235.

© Kalyo — kalyo.io | Recurso de uso clínico libre. No sustituye evaluación profesional.